

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	Desinfektionsplan	Dokumentennummer: Nr 3.1 - 3-3 Seite: 1 von 5
---------------------------------	--------------------------	---

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Hygienische Händedesinfektion Händeschutz	• vor und nach der Behandlung • bei sichtbarer Verschmutzung • vor der Behandlung	Hände vollständig mit Präparat benetzen (ohne Wasser, Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feucht halten und Hände gegeneinander reiben. Entnahme des Desinfektionspräparates aus Direktspender. Danach bei Bedarf Handschuhe anlegen.	desderman® SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig - 30 Sek.</i>  desmanol® care SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig - 30 Sek.</i>  Einmalhandschuhe	Ärzte Fachpersonal
Händewaschung	• bei Arbeitsbeginn • vor Pausen • nach Arbeitsende	Hände gründlich mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen. Gemeinschaftshandtücher dürfen nicht verwendet werden. Entnahme des Waschpräparates aus Direktspender.	sensiva® wash lotion SIDA+Produktinfo 	Ärzte Fachpersonal
Hautschutz und Hautpflege	• in Arbeitspausen bzw. nach der Arbeit	Hautpflegemittel in die Haut einmassieren. Entnahme aus Spender-Flasche.	Pasta cerata	Ärzte Fachpersonal

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	1.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	Desinfektionsplan	Dokumentennummer: Nr 3.1 - 3-3 Seite: 2 von 5
---------------------------------	--------------------------	---

Hautantiseptik	• vor der Behandlung • • bei talgdrüsenreicher Haut • (z.B. Kopf, vordere u. hintere Schweißrinne)	Hautpartien einsprühen/einreiben und einwirken lassen. Achtung: bei talgdrüsenreicher Haut beträgt die Einwirkzeit 2 Minuten.	kodan® Tinktur forte farblos SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig 1 Min.</i> <i>gebrauchsfertig 2 Min.</i> 	Ärzte Fachpersonal
Schleimhautantiseptik	• vor der Behandlung	Schleimhautareal vollständig benetzen oder mit benetztem Tupfer Haut abreiben.	octenisept® SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig ab 1 - 2 Min.</i> 	Ärzte Fachpersonal
Wundantiseptik	• bei Bedarf	Hautareal vollständig benetzen, trocknen lassen oder mit benetztem Tupfer Haut abreiben.	octenisept® Wund-Desinfektion SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig 1-2 Min.</i> 	Ärzte Fachpersonal


	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	1.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	Desinfektionsplan	Dokumentennummer: Nr 3.1 - 3-3 Seite: 3 von 5
---------------------------------	--------------------------	---

Instrumente allgemein	nach Gebrauch	Gebrauchte Instrumente vollständig und blasenfrei in geeignete Behälter mit Deckel und Siebeinsatz einlegen, Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten. Ggf. manuelle Nachreinigung, mit Leitungswasser gründlich abspülen, trocknen, verpacken (Sterilgutverpackung gemäß DIN), sterilisieren, danach trocken lagern.	gigasept® instru AF SIDA+Produktinfo 1,5 % - 60 Min. oder neodisher Septo PreClean 	Ärzte Fachpersonal
Sterilisation	- nach der Desinfektion - soweit erforderlich	Instrumente in Folienbeutel oder in Kassetten in Sterilisator legen. Nach Herstellerangaben sterilisieren.	Dampfsterilisator (Autoklav) bzw. Heißluftsterilisator mit automatischer Luftumwälzung	Fachpersonal
Aufbereitung von Wandspendern und Feuchttuchspendersystemen		Desinfizierende Aufbereitung. Siehe Standard Aufbereitung Wandspender Siehe Video Aufbereitung Tuch/Eimer Siehe Video schülke wipes safe & easy		
Desinfektionswannen, Reinigungs-/Ultraschallbecken	arbeitstäglich oder bei Lösungswechsel	Desinfizierend reinigen.	pursept® AF SIDA+Produktinfo 0,5 % - 60 Min. 	Fachpersonal
Kleine Flächen, Arbeitsflächen, Behandlungsliege-/stuhl	nach jeder Behandlung	Aufbringen der Lösung, auf vollständige Benetzung achten, überschüssige Präparatmenge entfernen.	mikrocid® AF liquid SIDA+Produktinfo gebrauchsfertig 1 Min.	Fachpersonal

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	1.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	Desinfektionsplan	Dokumentennummer: Nr 3.1 - 3-3 Seite: 4 von 5
---------------------------------	--------------------------	---

			 Schnell-Desinfektion mikrozid® AF wipes SIDA+Produktinfo <i>gebrauchsfertig 1 Min.</i>	
Waschbecken, Toiletten: Brille, WC-Becken	- nach sichtbarer Verschmutzung - und nach Beendigung der Sprechsstunde abends	Flächen mit in Desinfektionsmittellösung getränktem Putztuch wischen, ggf. konzentrierter Einsatz durch Ausbringen aus der Spritzflasche. Einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten, gut mit Wasser nachwischen.	Desinfektions- Reiniger® AF SIDA+Produktinfo <i>konz. - 1 Min.</i> 	Reinigungspersonal Fachpersonal
Große Flächen, Fußboden, Wände etc.	nach sichtbarer Kontamination	Flächen mit in Desinfektionsmittellösung getränktem Putztuch oder Mop wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	quartamon® med SIDA+Produktinfo <i>1 % - 60 Min.</i>	Fachpersonal

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	1.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	Desinfektionsplan	Dokumentennummer: Nr 3.1 - 3-3 Seite: 5 von 5
---------------------------------	--------------------------	---

	und täglich 1 x nach Beendigung der Sprechstunde		 pursept® AF SIDA+Produktinfo 0,5 % - 60 Min. 	
Wäsche	- nach Gebrauch - bei sichtbarer Verschmutzung - sofort	In die dafür vorgesehenen Wäschesäcke abwerfen. Entweder Kochwaschgang oder 60° C - Waschgang und desinfizierendes Waschmittel lt. VAH-Liste.	handelsübliche Waschmaschine	Fachpersonal
Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände	nach Gebrauch	Entsorgung in stich- und bruchsichere Behältnisse. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Gem. TRBA 250 - 4.2.5, Unterpunkt 6		Fachpersonal
Hinweis		Die Inhalte des Hautschutz- und Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen.		

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	1.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			